

ជីទឹកសរីរាង្គជប៉ុន

A

Japanese Organic Microbial Fertilizer

សារធាតុចិញ្ចឹម : N=0.27%, P=0.22%, K=0.21%, Zn=5ppm
 Seaweed Extract=10%, Amino acid=5%, Humic acid=10%,
 Fulvic acid=5%, Protein=3%, Organic matter=60%
 Alginic acid=1%, Ca=70ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



01

ជីទឹកសរីរាង្គជប៉ុន (A)
មានចំណុះ 1L , 5L , 22L

គុណប្រយោជន៍

ជីទឹកសរីរាង្គជប៉ុន ជាប្រភេទជីទឹកដែលជួយជំរុញការលូតលាស់ ឬស ស្លឹក ដើម ផ្កា ផ្លែ មើមដំណាំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពីបច្ចេកវិទ្យាសរីរាង្គ (Organic Microbial Fertilizer) ដ៏ទំនើបចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ។ បង្កើនភាពអំណាចអត់ធន់ទប់ទល់ជាមួយនឹងការឡើងកំដៅនិងជម្ងឺ ។ បង្កើនកម្លាំងផ្កាភ្លឺ ថែរក្សាផ្កាភ្លឺបំប៉នអាយុជ្រុះ ។ កែប្រែគុណភាពដីឲ្យកាន់តែល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ បង្កើនទិន្នផលពី 20%-30% ។ អនុវត្តដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងបរិស្ថាន ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល : ចំប៉នលូតលាស់ ឬស ស្លឹក ដើម ផ្កា ផ្លែ មើមដំណាំបានល្អ ។
បាញ់បំប៉នស្លឹក : 1L ជើលាយទឹក 250L ឬ 100លេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញស្លឹកបាន 4 ឬ 5ឡើងទៅ ។
បាញ់បំប៉នផ្កាផ្លែ : 1L ជើលាយទឹក 350-500L ឬ 50-70លេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញស្លឹកបាន 4 ឬ 5ឡើងទៅ ។
ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក : លើត្រជីលាយជាមួយទឹក 350-500L បង្ហូរស្រោចស្របតាមគល់ដំណាំ 5-7 ថ្ងៃម្តង ។
ត្រាំពូជ : ត្រាំដើមដំណាំ ត្រាបពូជ មុនដាំ ដើម្បីអោយមានជីព្យុះត្រាបពូជដុះល្អ លឿន កាត់បន្ថយជម្ងឺផងនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ពោត ស្រូវ សង្ក្រាន្ត

Fulvic Acid=5%, (Atonik,Seaweed,Amino) = 10%



02

មេនុចំណុះ: 1L , 5L

គុណប្រយោជន៍

វិសេដ្ឋីធំឡូង ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវចរាចរណ៍ផ្លូវដី - បង្កើនសមត្ថភាពទប់ស្កាត់កត្តាចង្រៃ - បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរអាស៊ីតជី - បង្កើនសមត្ថភាពជីនិងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹម - មានគុណទីជួយបំបែងមីក្រូធាតុពិជ្ជមានជាតិ និងបង្កើតនាពងាយស្រួលរកសម្រាប់រុក្ខជាតិ - ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ឫសនិងដំណុះគ្រាប់ចប់ចល់និងនាពងស្លូត - កាត់បន្ថយនាពងត្រង់ដោយសារថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត - កាត់បន្ថយកាកសំណល់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងសារធាតុពុលនៅក្នុងដី - បង្កើននាពងជ្រាបចូលនៃឆ្នាសកោសិកានិងជញ្ជាំងដើម្បីបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម ។

ការប្រើប្រាស់

រុប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល : បំប៉នលូតលាស់ បុរស ស្លឹក ដើម មើមធំធាត់បានល្អ ។

ចាត់វ៉ា : 1L រំពើលាយទឹក 250L ឬ 100លេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញពន្លកស្លឹកបាន 4 ឬ 5 ថ្ងៃរៀងទៅ ។

រូបព័ន្ធទំណាក់ទី៣ : លើគ្រឿងលាយជាមួយទឹក 250L បង្ហូរត្រួតពិនិត្យបតាមគល់ដំណាំ 5-7 ថ្ងៃម្តង ។

ត្រាំពូង : ត្រាំដើមដំឡូង គ្រាប់ពូជ មុនដាំ ដើម្បីអោយមានជំនុះគ្រាប់ពូជដុះល្អ លឿន កាត់បន្ថយសត្វល្អិត (កណ្តៀវ ស្រមោច) មិនស៊ីកាត់បន្ថយជម្ងឺ ធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh



ចំណាត់ថ្នាក់ផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

ហ៊ុយមិច ហ្វូរិច 95

D Humin

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=0.98%, P=0.31%, K=19%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្តបន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ : Humic acid=80%
 Fulvic acid=15%, Amino acid=5%, N=0.98%, P=0.31%, K=19%
 Cu=25ppm, Zn=726ppm, Mn=25ppm, Fe=2726ppm

Bopha បុច្ឆា
 Organic Agriculture រដ្ឋបាលកសិកម្ម

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
 Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



03

មានទម្ងន់ 250g, 1Kg

គុណប្រយោជន៍

- ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធដី - បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដី (CEC) ឲ្យប្រសើរឡើង - បង្កើនសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ក្លាចង្រៃ - បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរអាស៊ីតដី
 - បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីនិងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹម - មានគុណភាពជួយបំបែកមីក្រូសារធាតុពីធម្មជាតិនិងបង្កើននាពេលវេលាស្រូបសារធាតុសម្រាប់រុក្ខជាតិ - ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ឬសនិងដំណុះគ្រាប់
 ទប់ទល់នារោងស្ងួត - កាត់បន្ថយនាពេលវេលាដោយសារធាតុសម្រាប់សត្វល្អិត - កាត់បន្ថយការកាសំណល់ឬសម្លាប់សត្វល្អិតនិងសារធាតុពុលនៅក្នុងដី - បង្កើននាពេលវេលាបំបែកសារធាតុសរសៃកាស៊ីនដ៍រុក្ខជាតិ
 ដើម្បីបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម ។

ការប្រើប្រាស់

- 1/ បាញ់បំប៉នលើស្លឹក : ជីក្រាមលាយទឹក 2លីត្រ, 10ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 100ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 250ក្រាមលាយទឹក 500លីត្រ, 500ក្រាម លាយទឹក 1000លីត្រ ,1គីឡូក្រាម លាយទឹក2000លីត្រ ។ បាញ់លើដំណាំពី 7-10ថ្ងៃម្តង ប្រើ 2-3ដង ។
- 2/ បាញ់ជម្រុញឆ្មុយ : ជីក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក500លីត្រ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក1000លីត្រ ។ បាញ់លើដំណាំពី 7-10ថ្ងៃម្តង ប្រើ 2-3ដង ។
- 3/ លាយទឹកស្រោចគល់ : ជីក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក 500លីត្រ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក1000លីត្រ ។ ស្រោចចន្លោះ ពី 15-30ថ្ងៃម្តង ។
- 4/ ត្រាំគ្រាប់ពូជ : ជីក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក500លីត្រ,1គីឡូក្រាម លាយទឹក1000លីត្រ ។
- 5/ លាយជីបាចឬដាក់គល់ : ជីបា(50Kg)លាយជាមួយជី 2Kg ច្របល់ចូលគ្នាឲ្យស្រួចអាចយកទៅប្រើបាន ។
 មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលណាបាញ់នៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាច ក្រោយពីបាញ់រួចក្រោម 6ម៉ោង បើត្រូវទឹកឡើងវិញបាញ់ឡើងវិញ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

មេរៀនសរីរាង្គសារាយសមុទ្រ

B

Seaweed Extect Powder

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=1.24%, P=4.19%, K=19.68%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមនិងមីក្រូសារធាតុ : Cu=75ppm

Zn=75ppm, Mn=50ppm, Fe=1747ppm

សារធាតុសរីរាង្គ=50%, Alginic Acid=15%, Himic=15%

Cytokinin, Betaine, Vitamin,


Trehalase, Amino Acid



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



04

មាឌទម្ងន់ 100g

គុណប្រយោជន៍

- ជួយឱ្យរុក្ខជាតិអាចស្ម័គ្រចំណីអាហារបានលឿនជាងផ្សេងៗដូចជាកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួត ។ - ផ្តល់ឱ្យរុក្ខជាតិស្រូវតាមផ្លូវប្រសើរជាងមុនចំពោះការជញ្ជក់របស់សត្វល្អិតនិងការវាយប្រហារដោយផ្សិត។
- ជម្រុញដំណុះគ្រាប់ពូជនិងកាត់បន្ថយការរតក - ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រសិនបើដំណុះជម្រុញការចេញផ្កានិងផ្លែយ៉ាងខ្លាំងក្លា
- ជួយបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដូច្នេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជី។
- បង្កើននិងរំលោភអតិសុខុមប្រាណដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងដីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធដី។

ការប្រើប្រាស់

លាយជាមួយទឹក: មេរៀន1ក្រាមលាយទឹក2,5លីត្រ, 10ក្រាមលាយទឹក25លីត្រ, 100ក្រាមលាយទឹក250លីត្រ, 1គីឡូក្រាមលាយទឹក2500លីត្រ។ បាញ់លើដំណាំពី7-10ថ្ងៃម្តង។ អនុវត្តតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក 3-4ដង ចាប់ពីដំណាំដុះលូតលាស់បានស្លឹក 3-4ដងឡើង រហូតដល់ផ្លែផ្កា ។ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ កាលណាបាញ់នៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាច ក្រោយពីបាញ់រួចក្រោម 6 ម៉ោងបើត្រូវទឹកភ្លៀងឬបាញ់ឡើងវិញ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉នបំបែកគុម្ព

ស៊ីផ្លាស់ / Seaplus

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N= 15.27%, P=14.98%, K=15.08%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមសំបុក : Cu=199ppm, Zn=262ppm

Mn=150ppm, Fe=174ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



05

មានចំណុះ

250ml , 500ml , 1L

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉នបំបែកគុម្ព Seaplus មានផ្ទុកដោយពពួកមីក្រូសារធាតុបំប៉នច្រើនប្រភេទ និងជួយបំបែកពពួកមីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម ជួយបង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ជួយអោយដំណាំដុះលូតលាស់ ចេញត្រួយដឹងមែក គុម្ព ធំធេងបានលឿន ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រើបាញ់បំប៉ន ដើម ស្លឹក បែកគុម្ពធំ លើដំណាំ (ស្រូវ សណ្តែក ល្ង បន្លែស្លឹក...) ដី 1L លាយទឹក 500L , ដី 50cc លាយទឹក 25L


ប្រើបាញ់បំប៉ន ដើម ស្លឹក ឬបែកមែកច្រើន លើដំណាំ (ស្វាយ ចន្ទី មាន ធុរន សារម៉ា...) ដី 1L លាយទឹក 1000L , ដី 25cc លាយទឹក 25L

បាញ់ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់អោយចេញត្រួយថ្មី ឬអោយបែកគុម្ពរយះពេល 7-15ថ្ងៃម្តង។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំជំងឺនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្សេងៗបាន (អាចប្រើលាយជាមួយជីសរីរាង្គសារាយសមុទ្រប្រភេទ B) ដើម្បីអោយការលូតលាស់បែកគុម្ពកាន់តែប្រសើរ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ស៊ីរីង បូរុនប្រូ



Seaweed Boron Pro

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=5.90%, P=0%, K=0%,

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថាបន់ : B=40%

Seaweed=20%, Organic=20%, Zn=12ppm

Fe=25ppm



មានចំណុះ

250ml , 500ml , 1L



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



06

គុណប្រយោជន៍

ស៊ីរីង បូរុនប្រូ ចូលរួមសំយោគបង្កើតកំផែងកោសិកាបញ្ចេញផ្កាអោយបានច្រើន ជួយលើកកម្ពស់អោយផ្កាបានស្រុះ
ទងធំវែង ជួយបង្កាត់កេសរញី-ឈ្មោល ឡើងក្តីបបានច្រើនធ្វើអោយផ្កាក្តីមានសុខភាពល្អរឹងមាំធន់ទ្រាំនឹងបម្រែបម្រួល
អាកាសធាតុ។

ការប្រើប្រាស់

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក2000លីត្រ ឬ 0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13cc លាយជាមួយទឹក25លីត្រ ។
ប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនចេញផ្កា និងចាប់ផ្តើមពកផ្កា ។ បាញ់2-3ដងមុនពេលផ្កាទឹក ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្រុញផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ប៊ូរ៉ុង ហ្គោលដិន

Boron Golden

B=16%+TE



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



មានចំណុះ 500ml , 1L



07

គុណប្រយោជន៍

ជី ប៊ូរ៉ុង ហ្គោលដិន មានប្រយោជន៍ដល់ដំណាំដោយ៖

1. ជួយបំបែកអាសូតពីខ្យល់ សម្រាប់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ។
2. ជំរុញដល់ការបង្កើតប្រូតេអ៊ីន។
3. ជួយក្នុងការបង្កើតក្លរូប៊ីល។
4. ជួយដល់ការបង្កើតវីតាមីន C និង B-complex។
5. ជួយដល់ការបង្កើតផ្កា បង្កាត់លំអ និងជម្រុញក្លឹប ផ្លែ។
6. ជួយកាត់បន្ថយនាពេលវេលាដុះដុះពីអាកាសធាតុរាំងស្ងួតស៊ីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងជីមួយចំនួន។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហ្វូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ផ្កាឈូក ម្សៅ តាវ៉ែន សាវ៉ែន ក្រូច ម្នាស់ ល្វាត ...) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក 500L ,ជី1L/ទឹក 1000L ។

- ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ អោត ដំឡូង សណ្តែក ល្វា ម្នាស់ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។

ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំ បាញ់2-3ដង ប្រើពេលផ្កាចាប់ផ្តើមរីក ។ បាញ់ផ្សែងក្រចកផ្កាឲ្យសព្វ ។

ចំណាំ : អាចប្រើបាញ់លើផ្កាពេលមានឆ្មារប្រើជី 1L លាយទឹក 2000-3000L ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ផ្កាស្រស់ ក្លឹបស្រស់

មីក្រូធាតុរួម / Micromix

សារធាតុចិញ្ចឹម : K=50g/L, Fe=30g/L, Zn=16g/L

Mn=7g/L, Cu=10g/L, S=10g/L, B=3g/L

Organic Matter=200g/L

Bopha បូផា
Organic Agriculture ផ្សារដំណើរការ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



08

ចំណុះ 500ml

គុណប្រយោជន៍

ផ្កាស្រស់ ក្លឹបស្រស់ គឺជាប្រភេទជីម៉ាយក្រូមិច ផ្គុំដោយម៉ាក្រូសារធាតុចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់បំពេញបន្ថែម ទៅអោយរាងខ្លះខាតរបស់រុក្ខជាតិជំនួយឲ្យ ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ មានសភាពស្រស់បំព្រងហើយជួយធ្វើអោយផ្កាមានកម្លាំង ឡើងក្លឹបបានលឿន ប្រកបដោយតាមរឹងមាំស្រស់ថ្លាផងនឹងរាងរាំងស្ងួត។

ការប្រើប្រាស់

ជី 1 លីត្រលាយជាមួយទឹក 2000 លីត្រ ឬ 0,5 លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000 លីត្រ ឬ 13cc លាយជាមួយទឹក 25 លីត្រ ។ ប្រើបានគ្រប់ដំណាក់កាល បាញ់ 2-3 ដងមុនពេលផ្កាទុក ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗ ទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

កាល់ស្យូម ប៊ូរ៉េ

K Ca + Boron

សារធាតុចិញ្ចឹម : Ca=310g/L, B=14g/L, Zn=4g/L



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



09

ចំណុះ 500ml , 1L

គុណប្រយោជន៍

កាល់ស្យូម ប៊ូរ៉េ ជាប្រភេទជីបំប៉នដែលផ្តល់នូវតាមខ្វះខាតនូវសារធាតុប៊ូរ៉េនិងកាល់ស្យូម យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបំពេញបន្ថែម ទៅអោយតាមខ្វះខាតដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិ, បង្កើនតាមដោតជ័យនៃលំអងផ្កាឡើងក្តីបបានលឿន, ការពារការ ជ្រុះផ្កានិងក្តីប ផ្តល់តាមរឹងមាំដល់ដំណាំ។ បង្កើនតាមអំណាចអត់ធន់ដល់រុក្ខជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងជម្ងឺតាមរយៈការផ្តល់សារធាតុ ចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែប។

ការប្រើប្រាស់

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក 2000លីត្រ ឬ 0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13សេសលាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
សម្រាប់ដើមឈើហូបផ្លែ ៖ បាញ់ពីរដងបន្ទាប់ពីរុក្ខជាតិចេញផ្កាបានរយៈពេល 1-2 សប្តាហ៍, បាញ់ 7-10 ថ្ងៃម្តង ។ អាចលាយ ជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

មហាឡើងក្ដីបលៀង Flower Promoter

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=0.70%, P=0.10%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម : Mg=5%, Mn=25ppm, Zn=80ppm

Mo=40ppm, Fe=200ppm, B=50ppm, Co=20ppm, Cu=80ppm,

(Sodium-P-Nitrophenolate=0.225% , Sodium-O-Nitrophenolate=0.150%

Sodium-5-Nitrophenolate=0.075% , Sodium-2,4-Nitrophenolate=0.037%)



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



10



មានចំណុះ 500ml, 1L

គុណប្រយោជន៍

មហាឡើងក្ដីបលៀង មានគុណវិញ្ញាបនបត្រអោយដំណាំមានការលូតលាស់ ហើយជួយអោយដំណាំបង្កើតផ្លូវសារធាតុ Auxin, Ethylene , Cytokinin, Gibberellin,... មានដំណើរការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។

- ជួយអោយដំណាំរីកលូតលាស់ខ្លាំងចេញផ្កា ឆាប់ជាងដំណាំដទៃទៀតក្ដីបបានលឿននិងកាន់ផ្លែច្រើន បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពរបស់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។

ការប្រើប្រាស់

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក2000លីត្រ ឬ 0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13សេសលាយជាមួយទឹក25លីត្រ ។

បាញ់1-2ដង បន្ទាប់ពីរុក្ខជាតិចេញផ្កាស្រះឬផ្ការីក, រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

ម៉ាញ៉េស្យូម ស័ង្កសី

Magnesium + Zinc

សារធាតុចិញ្ចឹម : Mg=14%, Zn=3%

Bopha បុប្ផា
Organic Agriculture របៀបដាំដុះធម្មជាតិ

ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



11

មានចំណុះ 500ml, 1L

គុណប្រយោជន៍

ម៉ាញ៉េស្យូម ស័ង្កសី ជាជីដែលជួយការពារនិងកែតម្រូវអាតសញ្ញាកង្វះខាត (Mg & Zn) យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជួយសម្រួលដំណើរការបំបែកថាមពល សំយោគប្រូតេអ៊ីននិងប្រព័ន្ធភូតូស៊ីន ។ បង្កើនភាពបែតង ជម្រុញការលូតលាស់នៃស្លឹក ជួយអោយមានភាពប្រក្រតី និងផលិតអ័រម៉ូនអុកស៊ីន (Auxin) ព្រមទាំងជម្រុញអោយឆាប់ចេញផ្កា ។ បង្កើតភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជម្ងឺ ។

ការប្រើប្រាស់

បាញ់ឫស្សីកាប់ចាស់ ប្រើជី 1L លាយទឹក 1000L, ជី 500ml លាយទឹក 500L, ជី 25ml លាយទឹក 25L ។

បាញ់បំប៉ន ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ ប្រើជី 1L លាយទឹក 2000L, ជី 500ml លាយទឹក 1000L, ជី 13ml លាយទឹក 25L ។

ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំ បាញ់ 2-3ដង ប្រើបានគ្រប់ដំណាក់កាល ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

អ៊ុលត្រា ស័ង្កសី

Ultra Zinc

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=0.10%, P=0.00%, K=0.03%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម និងមីក្រូសារធាតុ : Zn=306g/L, Ca=25g/L
 B=23g/L, Cu=50ppm, Mn=275ppm, Fe=1127ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
 Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



12

ចំណុះ 500ml ,1L

គុណប្រយោជន៍

- ជីបំប៉នទឹក អ៊ុលត្រា ស័ង្កសី (Ultra Zn) ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជួយបំពេញបន្ថែមនូវកង្វះសារធាតុស័ង្កសី (Zn, Ca, B) បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ។
1. Zinc មានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរការរបស់រុក្ខជាតិ ដូចជា ការចែកចាយអាហាររបស់កោសិកា និងជួយឲ្យរុក្ខជាតិមានកំលាំងលូតលាស់។
 2. Zinc គឺជាថ្នាំកំលាំងសំខាន់សម្រាប់ការផលិតអ៊ីយ៉ូតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបូកសរសៃរបស់រុក្ខជាតិ។
 3. Zinc គឺជាថ្នាំកំលាំងសំខាន់ក្នុងការផលិតក្លរ៉ូផ័ល (ធ្វើឲ្យស្លឹកឆាប់បាស់) ដែលជាផ្នែកមួយចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការរបស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីផលិតអាហារ។
 4. Zinc អាចជួយសម្រួលឲ្យរុក្ខជាតិមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ជំងឺ និងបន្ថយការខូចខាតពីសារធាតុពុលផ្សេងៗ។
 5. Zinc គឺជាសំខាន់សម្រាប់ការផលិតគ្រាប់ និងបង្កើនគុណភាពផលដំណាំ។
- សារធាតុ Zinc + Ca + B មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់រុក្ខជាតិនិងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិសុខភាពល្អ កើនទិន្នផល ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើប្រភេទ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ា ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L, ជី200cc/ទឹក200L, ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ត្រូវ រោត ដំឡូង សណ្តែក ល្អ ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc ក្នុងទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើបានគ្រប់ដំណាំកាល ស្លឹក ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ ។ បាញ់ 3-4ដង ប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង ។ ជួយឲ្យស្លឹកមានពណ៌បៃតងល្អ និងផ្កាផ្លែលូតលាស់បានលឿន កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

កាន់ក្តីប ផ្លែស្លាត

Seaweed Ca+Mg

សារធាតុចិញ្ចឹម : N=5.5%, K=0.5%,

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្លាប់បន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ : សារាយសមុទ្រ=30%

សារធាតុសរីរាង្គផ្សេងៗ=14%, Ca=10%, Mg=4%, Amino Acid=4%

Gibberellin=50ppm, Cu=269ppm, Zn=221ppm,

Fe=571ppm, Mn=621ppm



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



13

មានចំណុះ 500ml, 1L

គុណប្រយោជន៍

កាន់ក្តីបផ្លែស្លាត គឺជាប្រភេទជីបំប៉នដែលមានគុណភាពជួយកាត់បន្ថយជំងឺបណ្តាលឲ្យស្លៀតស្លឹកក្តីប ប្រេងផ្លែ រលួយផ្លែ ។ ការពារ និងកែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រូតេអ៊ីន (Mg) និងកាល់ស្យូម (Ca) បង្កើនសារធាតុបែតង បង្ការនូវការបាត់បង់ជាតិក្លរូទីន និងជួយបំពេញបន្ថែមដល់ការខូចខាតនៃមុខងារសារធាតុសំខាន់ៗ មួយចំនួនជួយលើកកម្ពស់ការធ្វើរស្មីសំយោគ ។ កែលម្អទ្រង់ទ្រាយផ្លែអោយមានរូបរាងនិងសម្បុរស្រស់ស្អាតជំនួស បង្កើនថាមពលជួយដល់ផ្លែឲ្យមានភាពរឹងមាំ ។ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រើជី 1L លាយទឹក 1000L , ជី 500ml លាយទឹក 500L , ជី 25ml លាយទឹក 25L ។ ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម ឡើងក្តីបទៅផ្លែបាញ់ 3-4 ថ្ងៃម្តង 7-10 ថ្ងៃបាញ់ម្តង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ស៊ីរីដ អាមីណូ Seamino

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 4%, K = 3%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្សុំ និងពពួកមីក្រូសារធាតុ : Seaweed Extract = 18%

Amino Acid = 10%, Alginic Acid = 2%, Organic matter = 12%, Ca = 70ppm

Mg = 47ppm, Fe = 270ppm



មានចំណុះ: 500ml, 1L

Bopha បុប្ផា
Organic Agriculture រដ្ឋាករកសិកម្ម

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



14

គុណប្រយោជន៍

ស៊ីរីដអាមីណូ មានគុណវិជ្ជមានបង្កើនអោយរុក្ខជាតិផលិតផលឆាប់ (ស្រូវ) ។ ផ្គត់ផ្គង់អាសូតសរីរាង្គដើម្បីគាំទ្រដល់រុក្ខជាតិដោយមានអាសូតអាមីណូសំខាន់ៗ បង្កើនការបែងចែកក្លរូតិលនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើស្លឹកសំយោគ ។ ជួយឲ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ ។ កំណត់ពេលវេលាផលិតផលឆាប់និងជម្រុញការចេញផ្កានិងផ្លែយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជម្ងឺរុក្ខជាតិមួយចំនួន ។ បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពដំណាំ ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រើជី 1L លាយទឹក 1000-2000L , ជី 500ml លាយទឹក 500-1000L , ជី 13-25ml លាយទឹកពី 25L ។

ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំបាញ់ គ្រប់ដំណាក់កាល បាញ់ 2-3ដង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

អាតូនិក


Atonik 1.8AS

បរិមាណធាតុសរុប : Sodium Nitrophenolate 1.8% AS



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



15

ចំណុះ 250ml , 500ml

គុណប្រយោជន៍

អាតូនិក មានគុណតម្លៃជម្រុញការលូតលាស់ ក្រួយ ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ មើម របស់ដំណាំ ។

- 1/ ជាអាហារថាមពលបន្ថែមយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការលូតលាស់យ៉ាងលឿនរបស់រុក្ខជាតិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើស្ទឹងសំយោគ ។
- 2/ ជម្រុញអោយមានការលូតលាស់ បែកគុម្ពបន្ថែមដល់ដំណាំ ។ 3/ ផ្តល់កម្លាំងគាំទ្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ពន្លកក្រួយ បង្កើនអត្រាពន្លកផ្កា ។ 4/ ជម្រុញឲ្យមានការបង្កកំណើតក្តឹប និងប្រឡាក់ទប់ទល់នឹងការជ្រុះផ្កាក្តឹបនិងផ្លែ ។ 5/ បង្កើននាពេលវេលាជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ 6/ បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពរបស់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រើជី 1L លាយទឹក 2000L , ជី 500ml លាយទឹក 1000L , ជី 13ml លាយទឹក 25L ។ ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំបាញ់ គ្រប់ដំណាក់កាល បាញ់ 2-3ដង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ស័ង្កសី ម៉ង់ហ្គាណេស

Zinc-Manganes



សារធាតុចិញ្ចឹម : Zn (EDTA) = 50g/L
 Mn (EDTA) = 50g/L , Organic matter = 50g/L
 Seaweed Extract = 200g/L

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
 Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



16

ចំណុះ 500ml , 1L

គុណប្រយោជន៍

ដំប៉ងស័ង្កសី ម៉ង់ហ្គាណេស ជាប្រភេទជីបំប៉នទឹកដែលមានសមត្ថភាពជួយទៅបំពេញនូវកង្វះខាតសារធាតុ Zn , Mnបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ការសំយោគក្លរូទីលនិងប្រូតេអ៊ីន ។ ជម្រុញការធ្វើស្លីសំយោគនិងការរំលាយអាសូត ការពារពន្លកព្រួយ ពន្លកផ្កា កំណើតក្លឹបពីការគាំង (ស្រួល) បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ត្រួច ...) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ត្រូវ រោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្លឹបនៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តងៗ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាមីណូ ស៊ីហ្គ័រ

Amino Sugar

សារធាតុចិញ្ចឹម (Amino acid, Complex Sugar Alcohol) = 200g/L

Ca = 16% , Mg = 1% , B = 1% , Zn = 1%



មានចំណុះ 500ml, 1L



17

គុណប្រយោជន៍

- ផ្តល់អាហារថាមពលសម្រេចបន្លាស់ឲ្យទៅរកជាតិ ។ - ជួយបង្កើតសមត្ថភាពស្លឹកដើម្បីធ្វើស្តីសំយោគបានល្អ ។
- ជួយដំណើរការកើតកោសិកាថ្មី (ស្លឹក ផ្កា) ។ - ជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះ និងជួយឲ្យកាន់ក្តីបង្កើតបានល្អ ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើប្រាំង (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L , ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល គ្រុយ ផ្កា ក្តីប ផ្លែ 3-4ដង ប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

កាបូន អុកស៊ីន

Caboron Auxin

សារធាតុចិញ្ចឹម : N=1%, P=0.5%, K=2%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិច : Ca=10%, B=10%

Amino acid = 2%, Seaweed = 2% (Glucose, Auxin, NAA) =8000ppm

Fe=30000ppm, Mn=6500ppm, Zn=1000ppm, Cu=100ppm



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



18

មានចំណុះ 500ml, 1L

គុណប្រយោជន៍

- ផ្តល់រាពាងខ្លះខាតនៃសារធាតុ កាល់ស្យូម បូរុង អុកស៊ីន អ៊ីនអេមេ (Ca B Auxin NAA) យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅអោយរាពាងខ្លះខាតដែលជាសារធាតុចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិ ។ បង្កើនរាពាងជ័យនៃលំអងផ្កា ឡើងក្តីបបានលឿន ការពារការជ្រុះផ្កានិងក្តីប ផ្តល់រាពាងរឹងមាំដល់ដំណាំ ។ បង្កើនរាពាងអំណាចអត់ធនដល់រុក្ខជាតិ ដើម្បីទប់ទល់នឹងជម្ងឺតាមរយៈការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែប ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើប្រុបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាដៃន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L,ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំ បាញ់2-3ដង ប្រើពេលផ្កាចាប់ផ្តើមរីក ។ បាញ់ផ្សែងក្រូចលើផ្កាឲ្យសព្វ ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

👉 ចំណាំ : អាចប្រើបាញ់លើផ្កាពេលមានរន្ទៀងប្រើជី 1L លាយទឹក 2000-3000L ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉នផ្កា ក្លឹប ផ្លែ

NPK 3-37-37+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=3.01%, P=37.20%, K=36.89%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិច និងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=53ppm
Mn=100ppm, Fe=125ppm



មានចំណុះ 1L



19

គុណប្រយោជន៍

ជាប្រភេទជីគីកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំជីវិតប្រព័ន្ធបូស ផ្កា ក្លឹប ផ្លែលូតលាស់បានលឿន បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។
ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយកាត់បន្ថយការលូតលាស់ផ្នែកស្លឹក ជួយជំរុញឲ្យដំណាំឆាប់ចេញផ្កាស្រះ កាន់ក្លឹបបានល្អ ផ្លែមាន
ទម្ងន់និងបង្កើនទិន្នផលបានច្រើន ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L, ជី200cc/ទឹក200L, ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ រោត ដំឡូង សណ្តែក ល្អ ម្កាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្លឹបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្លឺផ្សេងៗ
ទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ដើម ត្រួយ ស្លឹក

NPK 40-10-10+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=39.98%, P=10.12%, K=10.98%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថាប្រសិទ្ធភាព និងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=329ppm

Mn=200ppm, Fe=397ppm



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



20

មាឌចំណុះ 1L

គុណប្រយោជន៍

ដី NPK 40-10-10+TE ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជួយដល់ការលូតលាស់ ឬស ដើម ស្លឹក ជួយឲ្យដំណាំមានសុខភាពល្អ បង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ។ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ត្រូវ រោច ដំឡូង ស្ពៃពោក ល្អ ម្ចាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដីបំប៉នដើមស្លឹក បាញ់ 3-4 ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ចេញផ្កាស្រុះ

NPK 10-40-10+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=10.5%, P=40.22%, K=9.97%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្លំ និងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=918ppm
Mn=125ppm, Fe=249ppm



មានចំណុះ 1L



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



21

គុណប្រយោជន៍

ជី NPK 10-40-10+TE ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរសម្រាប់ដំណាំ ជួយឲ្យដំណាំបែកគុម្ពបានល្អដំណាំដែលជិតចេញផ្កា ឆាប់ចេញផ្កាស្រុះ ចេញផ្កាបានច្រើន និងកាត់ក្តីបានល្អ បង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ។ បង្កើនភាពឆ្លាស់ទ្រាំខ្ពស់របស់ដំណាំទៅនឹងរោគាសាត់និងនៃការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ ។

ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L, ជី200cc/ទឹក200L, ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ក្រូច កោត ដំឡូង សណ្តែក ល្អ ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តីបរិច្ចាគផ្លែ 3-4ដង ប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

បុប្ផាបង្កើនទិន្នផល

NPK 13-7-44+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=10.14%, P=9.99%, K=40.21%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិច : Cu=ND, Zn=10ppm

Mn=50ppm, Fe=25ppm



មានចំណុះ 1L



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



22

គុណប្រយោជន៍

ដំប៉ង ប្រាក់ ក្តីប ផ្លែ NPK 13-7-44+TE ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំដើម្បីជំនួយដល់ការលូតលាស់ស្លឹក ក្តីប ផ្លែ មើម ជំនាត់លូតលាស់បានលឿន ។ កែលម្អទ្រង់ទ្រាយផ្លែអោយមានរូបរាង និងសម្បុរស្រស់ស្អាតល្អបង្កើតថាមពលជួយដល់ផ្លែអោយមានភាពរឹងមាំ ។ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ ទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតពីជំងឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។


ការប្រើប្រាស់

- ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាវ៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច ...) ជី25cc/ទឹក25L, ជី200cc/ទឹក200L, ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L ។
 - ដំណាំតូចៗ (ត្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្អ ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ...) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L ។
- ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តីបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តងៗ អាចលាយជាមួយជីដំប៉ង ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ដើម ស្លឹកល្អ



NPK 30-10-10+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 29.97%, P = 10.18%, K = 9.95%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចនឹងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=10ppm
 Mn=25ppm, Fe=175ppm



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



23



មានទម្ងន់ 50g, 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉នដើមស្លឹកល្អ NPK 30-10-10+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន 100% ផ្តល់អាហារចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយការលូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់សម្រាប់ដីបំប៉ន ដើម ស្លឹក គ្រួយ ។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យចេញគ្រួយប្រើជី 50-100ក្រាម/ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហ្មត់បែកខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយ ជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន បូស ផ្កា


P NPK 10-60-10+TE
 សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 10.11%, P = 59.97%, K = 9.98%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=46ppm
 Mn=25ppm, Fe=174ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



24

មានទម្ងន់ 50g, 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉នបូស ផ្កា NPK 10-60-10+TE ជាប្រភេទជីវលាយក្នុងទឹកបាន 100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរវិបលដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធបូស លូតលាស់ផ្កាបានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយអោយដំណាំដែលជិតចេញផ្កា ឆាប់ចេញផ្កាហើយជួយអោយចេញ ផ្កាច្រើននិងក្លឹបកាន់បានល្អ ។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក 250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តង ។ គួរបៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយ ជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជីវី ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ផ្កា ផ្លែ

MKP 0-52-34+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 0.00%, P = 51.99%, K = 34.20%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=93ppm, Mn=ND, Fe=100ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
 Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



25

មាឌទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉នផ្កាផ្លែ MKP 0-52-34+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100%ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរស្របដល់ដំណាំជិន្នន័យប្រព័ន្ធប្រកបដោយបរិស្ថានធម្មជាតិ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយជំរុញអោយឆាប់ចេញផ្កា កាន់កាប់ ផ្លែផ្កា និងមាំឆ្លងទ្រាំនឹងជម្ងឺអាកាសធាតុប្រែប្រួល។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាប្រើជី 85-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្កាផ្លែប្រើជី 50-60ក្រាមលាយ 1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក400-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាផ្លែ រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេល អាកាសធាតុក្ដៅហួតហែងខ្លាំងក្រោយពីបាញ់លើផ្លែទឹកត្រូវរងក្រោម 6ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជី ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ជីបំប៉ន ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ

M NPK 3-37-37+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 3.01%, P = 37.20%, K = 36.89%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=53ppm
 Mn=100ppm, Fe=125ppm



ទីសាកល្បងផ្នែកបច្ចេកទេស
 Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



26



មានទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ជីបំប៉ន ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ NPK 3-37-37+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធបូស ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ លូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយជំរុញអោយដំណាំឆាប់ចេញផ្កា កាន់ក្លឹបបានល្អ ផ្លែមានទម្ងន់និងបង្កើនទិន្នផល បានច្រើន។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅហ្មត់បែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយ ជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាសូរកាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ

NPK 6-32-35+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 3.01%, P = 37.20%, K = 36.89%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្សំនិងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=53ppm

Mn=100ppm, Fe=125ppm



ទីសាកល្បងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



27

មានទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ជាប្រភេទជីវលាយក្នុងទឹកបាន 100% ផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងសម្បូរសម្រាប់ដំណាំនិងបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ជួយសន្សំអាហារថាមពល ជួយបិទត្រួយ ជួយឲ្យចេញផ្កាបានស្រះកាន់ផ្កា កាន់ក្លឹប ក្លឹបឆាប់ធំលឿនបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ផងទៀតនឹងអាកាសធាតុ ។

ការប្រើប្រាស់

ជំនួញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ គឺស្មើក្រោមលាយទឹក 250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តង។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ

S

NPK 21-21-21+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 21.20%, P = 21.14%, K = 20.95%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមស្នូលនិងមីក្រូសារធាតុ : Cu=50ppm, Zn=215ppm

Mn=299ppm, Fe=2831ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



28



មានទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉ន ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ NPK 21-21-21+TE ជាប្រភេទជីវលាយក្នុងទឹកបាន**100%** ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធបូតពូជលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ដំណាក់កាល ស្លឹក ផ្កា ផ្លែនិងជួយបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យលូតលាស់លឿនទៅលើដី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10 ថ្ងៃម្តង ។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ



F NPK 5-7-44+TE
 សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 5.02%, P = 6.98%, K = 44.22%
 សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ : Cu=274ppm, Zn=143ppm
 Mn=499ppm, Fe=475ppm

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
 031 788 8080



29



មានទម្ងន់ 50g, 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉ន ផ្កា ក្លឹប ផ្លែ NPK 5-7-44+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសមរម្យបែបដល់ដំណាំបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។
 ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ជំនួយផ្កាក្លឹប ផ្លែ គ្រាប់ មើម អោយឆាប់ធំលឿនផលទ្រាំនឹងជម្ងឺ ។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញក្លឹបផ្លែប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10 ថ្ងៃម្តង ។ គួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើស្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។
 អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជីដី ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាសូតកាត់ (non-alkaline) បាន។

ដីកាលី

NPK 0-0-60+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 0.00%, P = 0.00%, K = 60.05%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=73ppm, Mn=225ppm, Fe=831ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



30



មានទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ជាប្រភេទជីវលាយក្នុងទឹកបាន 100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំជំនួយដល់ការលូតលាស់ ផ្លែ មើមបានលឿន បង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយជំរុញអោយផ្លែ មើមធំឆាប់បានលឿន ឆាប់ដាក់ម្សៅ សាច់ឆែន ផ្លែមានទម្ងន់និងបង្កើនទិន្នផលបានច្រើន ។

ការប្រើប្រាស់

(បាញ់ស្លឹក ស្រោចគល់ ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក បន្លែក្នុងទឹក) ជំរុញឲ្យផ្លែមើមធំប្រើជី 100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ គឺឡូក្រាមលាយទឹក 250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្លែមើមប្រើជី 50ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ គឺឡូក្រាមលាយទឹក500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាក្តីបង្កើន រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរចៀសវាងបាញ់ នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោមម៉ែងគួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំងបាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ប៊ីអិល ប៉េ កា

NPK 15-0-0+26Cao+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N=15.68%, P=0.00%, K=0.00%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបន្តិចមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=15ppm

Mn=25ppm , Fe=75ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



31



មានទម្ងន់ 1Kg

គុណប្រយោជន៍

ជាប្រភេទជីវលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរសម្រាប់ដំណាំ ជិន្នន័យប្រព័ន្ធបូស លូតលាស់បានលឿន បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ប្រើពេលចេញត្រួយនិងចេញផ្លែ។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាប្រើជី 85-100ក្រាម/1ធុងបាញ់25លីត្រ 1kgលាយទឹក 250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្កាភ្លឺប្រើជី50-60ក្រាម/1ធុងបាញ់25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក 400-500លីត្រ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាភ្លឺផ្លែ រយៈពេល 7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ប្រើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម ៦ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជីដំណើរមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ដីបំប៉ន ផ្លែ

NOP 13.7-0-46.8+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង : N = 13.08%, P = 0.00%, K = 46.09%

សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថាបន់បន្សំនិងមីក្រូសារធាតុ : Cu=ND, Zn=33ppm
Mn=ND, Fe=50ppm



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



32

មានទម្ងន់ 1Kg , 2Kg

គុណប្រយោជន៍

ដីបំប៉នផ្លែ NOP 13.7-0-46.8+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរស្របដល់ដំណាំល្អិតលាស់ បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ដីបំប៉នស្លឹក ផ្លែ គ្រាប់ មើម និងធ្វើអោយដំណាំមានសុខភាពល្អ ធន់ទ្រាំ នឹងជំងឺ។

ការប្រើប្រាស់

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាប្រើជី 85-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ គឺឡូក្រាមលាយទឹក250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្កាក្តិបផ្លែប្រើជី 50-60ក្រាមលាយ 1ធុង បាញ់ 25លីត្រ គឺឡូក្រាមលាយទឹក400-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាក្តិបផ្លែ រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរប្រុងប្រយ័ត្នបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុ ក្តៅហ្មត់ហ្មងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជីដល់មិន ផ្អាកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ

45%EW ការភ្លៀងទឹក



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Prochloraz 45% EW



មាឌចំណុះ 500ml



33

គុណប្រយោជន៍

ការភ្លៀងទឹក គឺជាប្រភេទថ្នាំការពារ កម្ចាត់ និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព វាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈការបញ្ចូលចូលក្នុងស្លឹក មែក និងផ្កាផ្លែ ហើយនឹងអស់បន្ទាយពេលបានយូរដើម្បីការពាររុក្ខជាតិឲ្យជៀសផុតពីជម្ងឺ ។

ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប៉ារស្លឹក ផ្សិតស ល្បើងស្លឹក រលាកកន្ទុរ	កម្ចាត់ជម្ងឺ: 1ml/ទឹក1L 20ml/ទឹក20L 500ml/ទឹក500L បាញ់លើស្លឹក
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស ល្បើងស្លឹក	
ដំណាំហូបផ្លែ និងដំណាំផ្សេងៗ	រលាកផ្លែ រលាកកន្ទុរ រលាកផ្កា ផ្សិតលើផ្លែ ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោក្តីបន្លែផ្លែ	1ml/ទឹក1-2L 10-20ml/ទឹក20L 500ml/ទឹក500-1000L បាញ់លើស្លឹក

ការប្រើប្រាស់

- ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ 4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំ និងម្រេចដើមដំណាំប្រើប្រាស់ពេលរយៈពេល 20នាទី មុនយកទៅដាំឬប្រែស ដើម្បីកម្ចាត់ជម្ងឺផ្សិតជាមុន ។
- ត្រូវផ្អាកបាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផល មកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ



50% SC ស្អាតគ្រប់រដូវ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Tebuconazole 30% + Azoxystrobin 20% SC



មាតិកាចំណុះ: 500ml



34

គុណប្រយោជន៍

ស្អាតគ្រប់រដូវ 50% SC គឺជាប្រភេទថ្នាំជម្ងឺដែលមានពិសេសភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ អាចកម្ចាត់និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព វាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្លឹក មែក និងផ្កាផ្លែ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរដើម្បីការពារក្នុងការដាំដុះផ្សេងៗទៀត ជួយអោយស្លឹកផ្កាផ្លែរស់ដំណាំមានភាពស្រស់ស្អាត ។

ការប្រើប្រាស់

- គ្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ : លាយថ្នាំ 4ml/ទឹក1L ដាក់គ្រាំទងម្រេច ដើមដំណាំមិនមែនគ្រាប់ពូជផ្សេងៗយេះពេល 20 ទៅ 30 មុនយកទៅដាំ ឬព្រោះ ដើម្បីកម្ចាត់ជម្ងឺផ្សិតជាមុន ។
- គ្រូផ្អាកបាញ់ថ្នាំយេះពេល 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក បាវស្លឹក អ៊ូតស រលៀងស្លឹក រលាកកក	កម្ចាត់ជម្ងឺ: 1ml/ទឹក1L, ថ្នាំ 20ml/ទឹក20L, ថ្នាំ 500ml/ទឹក500L បាញ់រលឹក និងស្រោចគល់
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក អ៊ូតស រលៀងស្លឹក	
ដំណាំហ្វូផ្លែ និងដំណាំផ្សេងៗ	រលាកផ្លែ រលាកផ្កា អ៊ូតរលឹក អ៊ូតរលឹក ខ្លោចផ្កា ខ្លោចផ្លែ និងផ្លែ	កម្ចាត់ជម្ងឺ: 1ml/ទឹក1-2L, ថ្នាំ 10-20ml/ទឹក20L, ថ្នាំ 500ml/ទឹក500-1000L

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ

50% អ្នកការពារ Nak Kapear 50% EW



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Prochloraz 20%+Propiconazole 10% EW



មាឌចំណុះ 500ml



35



គុណប្រយោជន៍

អ្នកការពារ/Nak kapear គឺជាប្រភេទថ្នាំការពារកម្ទាត់និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈការបញ្ចូលចូលទៅក្នុងស្លឹកមែក និងផ្កាផ្លែ ហើយនឹងអូសបន្លាយពេលបានឃ្លុះដើម្បីការពាររុក្ខជាតិឲ្យជឿសផុតពីជម្ងឺ ។

ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប៉ាវស្លឹក ផ្សិតស លៀងស្លឹក	កម្ទាត់ជំងឺ: 1ml/ទឹក1L 20ml/ទឹក20L 500ml/ទឹក500L បាញ់លើស្លឹក និងស្រោចគល់
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយបួស រលួយផ្លែ	
ដំណាំហ្វូងផ្លែនិងដំណាំ ខ្វល់ហ្វូងផ្លែផ្សេងៗ	រលួយបួស រលួយផ្លែ រលួយដំណើរដើម ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោចផ្លែនិងផ្លែ	
		1ml/ទឹក1-2L, 10-20ml/ទឹក20L, 500ml/ទឹក500-1000L

ការប្រើប្រាស់

- គ្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ : លាយថ្នាំ 4ml/ទឹក1L ដាក់គ្រាំនិងម្រេច ដើមដំណាំមុនគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20 ឆ្នាំ មុនយកទៅដាំ ឬព្រោះ ដើម្បីកម្ទាត់ជម្ងឺផ្សិតជាមុន ។
- ត្រូវផ្អាកបាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ

ខូណាហ្សូល

100g/1 SC

Hexaconazole 100g/1 SC



មាឌចំណុះ: 1L

ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទជំងឺ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប្លាសស្លឹក អុចគ្រាប់ រលើងស្លឹក រលាកកូរ	2ml/ទឹក1L , 50ml/ទឹក25L 500ml/250L , 1L/ទឹក500L បាញ់លើស្លឹក
បន្លែត្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយផ្លែ	
ដំណាំហូបផ្លែ និងដំណាំផ្សេងៗ	រលាកផ្លែ រលាកផ្កា ផ្សិតលើផ្លែ ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោត្រីបនីងផ្លែ	1ml/ទឹក1L , 25ml/ទឹក25L 500ml/ទឹក500L 1L/ទឹក1000L បាញ់លើស្លឹក



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



36

អត្ថប្រយោជន៍:

ខូណាហ្សូល ជាប្រភេទថ្នាំការពារនិងព្យាបាល

សែបជីវាបយ៉ាងច្រើនចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិហើយ

និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារ និង

ព្យាបាល ជម្ងឺប្លាសស្លឹក ប្លាសថ្នាំងប្លាសកក

ប្លាសគ្រាប់ ស្លៀតគ្រាប់ ដែលកើតឡើងដោយផ្សិត ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ

78 ស្រីអ៊ីនវ៉ាន់

Three in one

WP



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Mancozeb 60%+Cymoxanil 8%
Dimethomorph 10% WP



មាឌទម្ងន់ 500g



37



អត្ថប្រយោជន៍ :

ស្រីអ៊ីនវ៉ាន់ / 3 in 1 ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណៈ ប៉ះផ្ទាល់ ជ្រាបលឿនចូលទៅក្នុងស្លឹក មានសមត្ថភាពកំចាត់លៀងរោគចិត្តសក្តិសិទ្ធក្នុងការការពារព្យាបាល និងកម្ចាត់ស្បូវផ្សិតមុនពេលឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ ។ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងជម្ងឺ : អុចស្លឹក ប៉ាវ៉ាស្លឹក ផ្សិតស លៀងស្លឹក រលួយបួស រលួយផ្លែ ប្រេះដើម ហៀរជើងលើដើម រលាកកន្ទួរ រលាកមុខច្រៀង ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោត្រីប ផ្លែ និងជម្ងឺបាក់តេរី ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទជំងឺ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប៉ាវ៉ាស្លឹក ផ្សិតស លៀងស្លឹក	កម្ចាត់ជំងឺ: 1,5-1,6g/ទឹក1L 37-40g/ទឹក25L
បន្លែត្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយបួស រលួយផ្លែ	0,5kg/ទឹក300-350L បាញ់លើស្លឹក និងស្រោចគល់ ការពារ: 1g/ទឹក1L, 25g/ទឹក25L
ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន សាវម៉ៅ តាដើន ដំណាំហ្វូបផ្លែ និងដំណាំឧស្សហកម្មផ្សេងៗ	រលួយបួស ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោត្រីបនិងផ្លែ	ថ្នាំ17g/ទឹក25L, ថ្នាំ0,5kg/ទឹក750L-1000L

- ជំងឺរលាកមុខច្រៀងរោគស្នា ប្រេះដើមហៀរជើង ក្រូច ធុរេន កោសសំបកឆ្កុយចេញ រួចលាយថ្នាំ100g/ទឹក1L លាបដោយជក់ទៅលើមុខស្នាមជំងឺឲ្យបាន1-2ដង។
- ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដោះលាយថ្នាំ4g/ទឹក1L ដាក់ត្រាំក្នុងម្រេចដើមដំឡូងមី ឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទី មុនយកទៅដាំ ឬ ព្រោះ ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
- ត្រូវផ្អាកបាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

80% ជីត្រីទិញ WP

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Propineb 70% WP



មាឌទម្ងន់ 500g



38



អត្ថប្រយោជន៍:

ជីត្រីទិញ ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់ ធ្វើការល្បឿនមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយជម្ងឺសរសៃទាត់ចិត្តហើយសក្តិសិទ្ធក្នុងការការពារដំណាំពីជម្ងឺផ្សិតនិងកម្ទាត់ស្លៀកផ្លែ មុនឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយជម្ងឺ : អុចស្លឹក ប៉ាវស្លឹក ផ្សិតស ល្បឿងស្លឹក ផ្សិតស រលួយឬស រលួយផ្លែ ប្រេះដើម ហៀរដើមលើដើម រលាកកន្ទួរ រលាកមុខចៀវ ដាបមែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោក្តីបនីងផ្លែ ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប៉ាវស្លឹក ផ្សិតស ល្បឿងស្លឹក	កម្ទាត់ជីវៈ 1,5-1,6g/ទឹក1L 37-40g/ទឹក25L 0,5kg/ទឹក300-350L
បន្លែត្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយឬស រលួយផ្លែ	បាញ់លើស្លឹក និងស្រោចគល់ ការពារ: 1g/ទឹក1L, 25g/ទឹក25L
ដំណាំប្រាំងផ្លែនិងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ	រលួយឬស រលាកកន្ទួរ ដាបមែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោក្តីបនីងផ្លែ	ថ្នាំ17g/ទឹក25L ថ្នាំ0,5kg/ទឹក750-1000L

- ជំងឺរលាកមុខចៀវដើរកៅស៊ូ ប្រេះដើមហៀរដើរ ក្រូច ផ្កាឆាយ កោសសំបកស្លុយចេញ រួចលាយថ្នាំ100g/ទឹក1L លាយដោយជក់ទៅលើមុខឆាយជំងឺឲ្យបាន1-2ដង។
- ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំលាយថ្នាំ4g/ទឹក1L ដាក់ត្រាំចងម្រូចដើមដីឲ្យឆ្ងាយ ឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទី មុនយកទៅដាំឬព្រោះ ដើម្បីកម្ទាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
- ត្រូវផ្អាកបាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

ថ្នាំការពារ & ព្យាបាលជម្ងឺ

70% ឃ្លីនហ្វាស់ WP



ទីនាក់ទីនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Thiophanate-Methyl 70% WP



មាឌទម្ងន់ 500g



39

អត្ថប្រយោជន៍:

ឃ្លីនហ្វាស់ ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់ ធ្វើការរលៀនចូលទៅក្នុង ដើម ស្លឹក មានសមត្ថភាពកំចាត់លៀនរហ័សទាន់ចិត្តហើយស័ក្តិសមក្នុងការការពារដំណាំពីជម្ងឺផ្លិត និងកម្ចាត់ស្បៀងផ្លិតមុនឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយជម្ងឺ អុចស្លឹក ប៉ាដាស្លឹក ផ្សិតស លៀងស្លឹក ផ្សិតស រលួយឫស រលួយផ្លែ ប្រេះដើម ហៀងដើម លើដើម រលាកក្បូរ រលាកមុខច្រវ៉ៃ ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោក្តីបនឹងផ្លែ ។

ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជម្ងឺ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	អុចស្លឹក ប៉ាដាស្លឹក ផ្សិតស លៀងស្លឹក	កម្ចាត់ជំងឺ: 1,5-1,6g/ទឹក1L 37-40g/ទឹក25L
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយឫស រលួយផ្លែ	0,5kg/ទឹក300-350L
ដំណាំហ្វូស្យូសិងដំណាំ ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ	រលួយឫស ប្រេះដើម ហៀងដើមលើដើម រលាកមុខច្រវ៉ៃ ងាប់មែក	បាញ់លើស្លឹក និងស្រោចគល់ ការពារ: 1g/ទឹក1L, 25g/ទឹក25L
	ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្លោក្តីបនឹងផ្លែ	ថ្នាំ13g/ទឹក25L, ថ្នាំ0,5kg/ទឹក1000L

- ជំងឺរលាកមុខច្រវ៉ៃដើមកៅស៊ូ ប្រេះដើមហៀងដើម ក្រូច ផ្កាអន្តរ កោសសំបកស្ពឺយចេញ រួចលាយថ្នាំ 100g/ទឹក1L លាបដោយជក់ ទៅលើមុខស្ពឺយជំងឺឲ្យបាន 1-2 ដង។
- គ្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដោះលាយថ្នាំ 4g/ទឹក1L ដាក់គ្រាំនិងម្រូច ដើមដីឡងមី ឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20 នាទី មុនយកទៅដាំឬ ព្រោះ ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
- ត្រូវផ្អាកបាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

បុប្ផាកម្ចាត់ខ្យង

BIO CAM

I-1



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Abamectin 5% EC



មាត្រដ្ឋានចំណុះ 500ml



40

គុណប្រយោជន៍

ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ : បុប្ផាកម្ចាត់ខ្យង (BIO CAM I-1) គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងខ្យងចង្រៃធ្វើសកម្មភាពបញ្ចូលចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតតាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតនិងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតពពួកដង្កូវគ្រប់ប្រភេទពពួកចែ ពឹងពាង គ្រប់ប្រភេទ ចែស...។ ល ។ ពពួកសត្វល្អិតបីជញ្ជក់: មមាច ទ្រីប ស្រមើល ស្រាំង មូសតែ រុយស្វា រុយស...។ល។ អាចប្រើប្រាស់ជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងជីប៉េសផ្សេងៗបានលើក លែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ200CC/200L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500Lបាញ់រយៈពេល5-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹក ឆ្លៀតក្រោម 6ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ។
+ សម្រាប់កម្ចាត់ខ្យងថ្នាំ 1លីត្រ ប្រើសម្រាប់ផ្ទៃដី 1 ហិកតា យកទៅចាក់តាមតំបន់ដែលមានខ្យងបំផ្លាញស្រូវឬចាក់តាមការបង្គាប់ទឹក មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត



រោយ គូ BIO CAM I-2

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Abamectin 2%+ Thiamethoxam 10% SC



41



មាឌចំណុះ 250ml, 500ml

គុណប្រយោជន៍

រោយ គូ គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពបញ្ចូលចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតនិងប៉ះផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិត
តាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតពពួកប៉ាវ៉ាស៊ីត ពពួកដង្កូវស៊ីស្លឹក
ថែសពពួកពីងពាងគ្រប់ប្រភេទ...។ ល ។ ពពួកសត្វល្អិតបីជញ្ជក់: មមាច ទ្រីប ស្រមើលស្រាំង មូសតែ រុយស្វា រុយស ខ្នងស្លាបរឹង ។
អាចប្រើរោយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងជីប៉េប៊ីនផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរបាញ់ឡើង
វិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជា
មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

អាប្រូស៊ីន

BIO CAM I-3

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Acetamiprid 30%+Buprofezin 50% WP



មានទម្ងន់ 250g, 500g



42

គុណប្រយោជន៍

អាប្រូស៊ីន ជាប្រភេទថ្នាំមានសមាសធាតុផ្សំពីមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតច្រើនដងទៅលើ ថែរពោត ទាត់ រុយស មមាចត្នោត មមាចខៀវ ស្រីង ស្រមើល ថែស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗ ទៀត បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រពះនិងជ្រាលចូលតាមកោសិកា ។

ការប្រើប្រាស់

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L, ថ្នាំ100g/250L, ថ្នាំ200g/ទឹក500L ។ បាញ់រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តងៗ គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើឆ្លៀតទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់ ។

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ពិយាដសត្វល្អិតគ្រប់មុខ

BIO CAM I-4

Emamectin 2.2%+Thiamethoxam 25% WDG



មាឌទម្ងន់ 250g



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080



43

គុណប្រយោជន៍

ពិយាដសត្វល្អិតគ្រប់មុខ ជាប្រភេទថ្នាំសម្រាប់សម្រាវសត្វល្អិតផ្សេងៗ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតទាំង
ទៅលើដង្កូវស៊ីស្លីក ដង្កូវមូស្លីក ដង្កូវរង្វង់ដើម ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវចាន់ផ្លែ ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវបាក់ខ្នង ថែរហាត ទាត រុយស មមាចត្នោត
មមាចខ្សៀវ ស្រីង ស្រមើល ថែស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់
លើសត្វល្អិតក្នុងក្រពះ និងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

ការប្រើប្រាស់

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L, ថ្នាំ100g/250L, ថ្នាំ250g/ទឹក500L ។ បាញ់រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តងៗគួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើស្រូវទឹកឡើងក្រោម
6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត
រោយហ្វាយ

BIO CAM I-5



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Emamectin 0,5%+chlorbenzuron 24.5% SC



មាតិកាចំណុះ 500ml



44

គុណប្រយោជន៍

រោយហ្វាយ ជាប្រភេទថ្នាំមាសសមាសធាតុផ្សំពីមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ ដង្កូវទ្វេដងនិងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះ និងជ្រាបចូលតាមកោសិកាដង្កូវឬសត្វល្អិត ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តង។ គួរបាញ់ឡើង វិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាំជា មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ក្រសាយ BIO CAM I-6



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Chlorpyrifos 50%+ Cypermethrin 5% EC



មាឌចំណុះ 500ml



45

គុណប្រយោជន៍

ក្រសាយ ថ្នាំនេះមានសមាសធាតុផ្សំពីរមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតបានខ្ពស់ទៅលើពពួកដង្កូវស្លឹក ដង្កូវម្លូស្លឹក ដង្កូវរោលទោងដង្កូវស៊ីញ៉ា ដង្កូវបាក់ខ្នង ដង្កូវហ្វូង ចែរលោត រុយស មមាចត្នោត មមាចខ្សែវ ស្រមើល ស្រង ចែស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមិនស្លាប់ថ្នាំ ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុង ក្រពះជ្រាបចូលតាមកោសិកាអាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗ បានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10 ថ្ងៃម្តងៗ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រសួរដល់ថ្នាំជាមុនសិន ។ ចំណាំ : ហាមប្រើនៅពេលដំណាំមានផ្កា ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

រោយ សេវេន

BIO CAM I-7



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Emamectin Benzoate 5% EC



មាត្រដ្ឋាន: 500ml



46

គុណប្រយោជន៍

រោយសេវេន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើសកម្មភាពបញ្ឈប់ចូលក្នុងផ្លូវដង្ហើម ក្រពះ សត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតតាំង លែងដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវរូងដើម ដង្កូវបោះផ្លែ ចែ មមាច ទ្រីប ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរបាញ់ឡើង វិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡកដបថ្នាំជា មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh


ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត
ពិសោធពីងពាង

BIO CAM I-8

Propargite 57% EW



មាឌចំណុះ 500ml



47

គុណប្រយោជន៍

ពិសោធពីងពាង គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់ បណ្តាលអោយសត្វល្អិតតាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ពីងពាងក្រហម ទ្រីប និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀត ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ 1ml ឬ 1CC/ទឹក 1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក 25L, ថ្នាំ 100CC/ទឹក 100L, ថ្នាំ 500ml/ទឹក 500L បាញ់រយះពេល 7-10 ថ្ងៃម្តង ។ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាំ មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

អាសេផាត

BIO CAM I-9



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Acephate 75% SP



មាឌទម្ងន់ 250g



48



គុណប្រយោជន៍

អាសេផាត មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចជា ដង្កូវ មេអំបៅ ចែលោត ទាត រុយស មមាចត្នោត ស្រាំង កណ្ត្តាប មមាចខ្សែ ស្រឹង មូសតែ ស្រមើល ចែស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗ ទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនសុំថ្នាំ ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រពះនិងជ្រាលចូលតាមកោសិកា ។

ការប្រើប្រាស់

ឈាមថ្នាំ13g/ទឹក25L, ថ្នាំ125g/250L, ថ្នាំ250g/ទឹក500L ។ បាញ់រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើឆ្លើងក្រោម 6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្មវិធីសត្វល្អិត



រោយ ថេន BIO CAM I-10

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Fipronil 5% SC



មាឌចំណុះ 250ml



49

គុណប្រយោជន៍

រោយថេន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពបញ្ចូលចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលឲ្យសត្វល្អិតគាំងរំលងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា : ដង្កូវ មមាច ស្រមោល មូសតែ ចៃ មមាច ទ្រីប ស្រាំង កណ្តាបកណ្តាវ មូសតែ រុយស្វា រុយស ។ ល ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ 1ml ឬ 1CC/ទឹក 1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក 25L, ថ្នាំ 100CC/ទឹក 100L, ថ្នាំ 250ml/ទឹក 250L បាញ់រយះពេល 7-10 ថ្ងៃម្តង។ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្មវិធីសត្វល្អិត

បុប្ផា អ៊ីមីដា

BIO CAM I-11



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Imidacloprid 350g/L SC



មាត្រដ្ឋានចំណុះ 500ml



50

គុណប្រយោជន៍

បុប្ផា អ៊ីមីដា គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ទ្រីប ពឹងពាងក្រហម មមាចត្នោត មមាចខៀវស្រីង ស្រវាំង ចៃស រុយស មូសតែ កណ្តាប (កណ្តាប) និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបញ្ចូលចូលក្នុងក្រពះ សត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតទាំងនោះគាំងលែងដំណើរការហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ 1ml ឬ 1CC/ទឹក 1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក 25L, ថ្នាំ 100CC/ទឹក 100L, ថ្នាំ 500ml/ទឹក 500L បាញ់រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តងៗ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាំ មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

បាយអ្ករខេម អាយថ្ងល

BIO CAM I-12



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Lambda-cyhalothrin 9.4% + Thiamethoxam 12.6% ZC



51

មាត្រដ្ឋាន: 500ml

គុណប្រយោជន៍

ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ : បាយអ្ករខេមអាយថ្ងល ថ្នាំមានសមាសធាតុផ្សំពីមុខធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតទ្វេដងទៅលើ ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវមូស្លឹក ដង្កូវរង្វង់ដើម ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវចោងផ្លែ ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវបាក់ខ្នង ចែរលោត ទាត រុយស មមាចត្នោត មមាចខ្សែវ ស្រឹង ស្រមើល ចែស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនស៊ាំថ្នាំ ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ លេបចូលតាមក្រពះ និងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តងៗ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវត្រឡប់មកមើលថ្នាំជាមុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ពិយាដង្កូវ

BIO CAM I-13



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Chlorantraniliprole 12% + Emamectin 3.5% SC



មាឌចំណុះ 500ml



52

គុណប្រយោជន៍

ពិយាដង្កូវ គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពបញ្ចូលចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតតាំងតែង ដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវរង្កើត ដង្កូវចោះផ្លែ ចែ មមាច ទ្រឹប ។ អាច ប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ការប្រើប្រាស់

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L, ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L, ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃម្តងៗ គួរបាញ់ឡើង វិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14 ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជា មុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

អេម៉ាទីន

ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

BIO CAM I-14



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Emamectin Benzoate 5.7% WDG



មាឌទម្ងន់ 200g



53

គុណប្រយោជន៍

អេម៉ាទីន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពបញ្ឈប់ចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតតាំងលែងដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវរូងដើម ដង្កូវចោះផ្លែ ចៃ មមាច ទ្រីប ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រចកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ការប្រើប្រាស់

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L, ថ្នាំ100g/250L, ថ្នាំ200g/ទឹក500L ។ បាញ់រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តងៗគួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

បូកាម្នាត់ស្តេចមហា

BIO CAM I-15



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Nitenpyram 20% + Pymetrozine 60% WDG



មាឌទម្ងន់ 250g



54

គុណប្រយោជន៍

ថ្នាំមានសមាសធាតុពីរមុខដែលធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតច្រើនជាង១០០ប្រភេទ រុយស មហាចត្តា មហាចខ្សែ ចែរលាត ទាត ត្រង ត្រាំង ត្រមើល ចែស ចែកន្ទុយមាន់ អណ្តើកមាសនិងពពួកសត្វដទៃទៀត។ ថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំបាត់សត្វល្អិតបានយ៉ាងរហ័ស។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើបច្ចុលក្នុងក្រពះនិងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

ការប្រើប្រាស់

- បន្លែ : (ត្រី ម្លូស ត្រសក់ ប៉េងបោះ ម្រះ ត្រឡាច ននោង ល្អៅ ស្លឹកខ្ចីស សណ្តែកត្នូ...និងពពួកបន្លែផ្សេងទៀត) លាយថ្នាំ 25g/ទឹក25L, ថ្នាំ 250g/250L
- ដំណាំឧស្សាហកម្ម : (ត្រូវ កាត ដំឡូង សណ្តែក ល្អ ថ្នាំដក់...និងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត) លាយថ្នាំ 25g/ទឹក25L, ថ្នាំ 250g/250L
- ដំណាំឈើប្រភេទ : (ឆ្មារ ចន្ទី ធុរេន សាវ៉ា មង្គ្រ ប៊ែរ ក្រូច មាន តាវ៉ែន ត្របែក ល្អុង ស្រកាតា ទំពាំងបាយជូរ ពុទ្រា...និងដំណាំឈើប្រភេទផ្សេងទៀត) លាយថ្នាំ 13g/ទឹក25L ថ្នាំ 130g/250L, ថ្នាំ 250g/500L ។ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6 ម៉ោង។ សូមបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ 14 ថ្ងៃឡើងមុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២២៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

អម្ព៊ុនជំរុញឱ្យចេញផ្កាខុសរដូវ

បាយអូរខេម គីដីអ-1

BIO CAM PGR-1



ទីតាំងផ្ទៃក្របច្នៃកម្ម
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Paclobutrazol 35% SC



មាត្រដ្ឋានចំណុះ 1L



55

គុណប្រយោជន៍

- អម្ព៊ុន Paclobutrazole 35% SC គឺជាថ្នាំបង្ការការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការជម្រុញឱ្យដំណាំស្វាយ ធុរេន ចេញផ្កាលឿន ច្រើន និងស្រះល្អ ។
- ចំពោះដំណាំស្រូវវិជ្ជាជីវៈបូផា បង្កើនការបែកគុម្ព និងចេញបូលច្រើន ផងនឹងជួយ កាត់បន្ថយការដួលរលំ និងស្រូវចេញផ្កាស្រះ គ្រាប់រំលោភ ។

ការប្រើប្រាស់

ដំណាំ	មុខងារប្រើប្រាស់	របៀបប្រើប្រាស់
ស្រូវ	- បង្កើនការបែកគុម្ព និងចេញបូល - ស្រូវវិជ្ជាជីវៈ ផងនឹងជួយ - ចេញផ្កាស្រះ គ្រាប់រំលោភ មានចម្រើន	បាញ់ស្រូវអាយុចន្លោះ 20-40ថ្ងៃ លាយថ្នាំ 25-30មីលីលីត្រ/25លីត្រ
ធុរេន	- បង្កើនការចេញផ្កាឱ្យច្រើន - ជម្រុញឱ្យចេញផ្កាបានលឿន ស្រះ	បាញ់លើដំណាំរុក្ខជាតិ លាយថ្នាំ 25-30មីលីលីត្រ / 25លីត្រ ឬ 1គីឡូក្រាមទឹក 1000លីត្រ
ស្វាយ	- បង្កើនការចេញផ្កាឱ្យច្រើន - ជម្រុញឱ្យចេញផ្កាបានលឿន ស្រះល្អ	- សម្រាប់ប្រភេទដំណាំ វិជ្ជាជីវៈ អម្ព៊ុន 4-5មីលីលីត្រ ក្នុងទឹក 10លីត្រ/ដើម - សម្រាប់ប្រភេទដំណាំធុរេន ឬ ធុរេន 5-6មីលីលីត្រក្នុងទឹក 10លីត្រ/ដើម

- + ចំណាំ : មុនប្រើអម្ព៊ុនបូផាសំលាប់សត្វល្អិតសត្វល្អិតកំពស់របស់ដើមស្វាយយើងជាមុនសិន វាស់ចាប់ពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀតឱ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់វាសិន រួចបូកជាមួយកំពស់ដើមស្វាយ ហើយចែកនឹង 2 ពេលយើងប្រើចែកនោះយកទៅគុណនឹង 4-5មីលីលីត្រ សម្រាប់ប្រភេទដំណាំ ហើយគុណនឹង 5-6មីលីលីត្រសម្រាប់ប្រភេទដំណាំធុរេនឬ រួចយកចំនួនដែលគុណយើងនោះទៅលាយជាមួយទឹក 10លីត្រ រួចយកទៅចាក់គល់ក្នុង ដើម ។
- ស្រោចអម្ព៊ុនបូផាសំលាប់សត្វល្អិតសត្វល្អិត បើមិនមានសំណើមទឹកស្រោចទឹក 2ដង 3ថ្ងៃស្រោចម្តង ជាមុនសិនពេលចាក់អម្ព៊ុនបូផាបើមិនមានស្រូវលើដំណាំស្រោចទឹកជាប្រចាំ 5-7ថ្ងៃម្តងរហូតដល់មានផ្លែផ្កាផ្កាចេញច្រើន ។
- ក្រោយពីចាក់នៅគល់រយៈពេល 20-25ថ្ងៃ ប្រសិនបើមានផ្លែផ្កាចេញច្រើនអ្នកអាចបន្ថែមដោយការបាញ់លើស្លឹកអាចលាយទឹក 2000លីត្រ ក្នុងលើត្រ ដើម្បីជួយជម្រុញអាយុស្លឹកបានឆាប់លឿន និងដើម្បីបង្ការការចេញផ្កាឱ្យច្រើន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

វិញ្ញាបត្រយ ផ្កា ក្លីប ផ្លែ

បាយអូរខេម តីជីអ-2

BIO CAM **PGR-2**



ទីនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Brassinolide 0.01% SL



មាឌចំណុះ 250ml



56

វិញ្ញាបត្រយ ផ្កា ក្លីប ផ្លែ :

1/ ផ្តល់កម្លាំងការគាំទ្រឱ្យអាយុប្រសើរឡើងដល់ពន្លកត្រួយផ្កាក្លីប បង្កើនអត្រាពន្លកត្រួយផ្កាក្លីប , 2/ ជំរុញអាយុមានការលូតលាស់បែកគុម្ពបន្ថែមដល់ដំណាំ
3/ ជំរុញការបង្កកំណើតក្រព័រផ្កា និងការចេញផ្កាប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការជ្រុះផ្កា និងក្លីប , 4/ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ឥទ្ធិពលសន្លឹមប្រៃ និងជំងឺ
រុក្ខជាតិ , 5/ បន្ស៊ាបឥទ្ធិពលនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីការកាត់សំណល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ។ អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជម្ងឺ ថ្នាំ
សម្លាប់ស្មៅ នៅពេលប្រើបាយជាមួយ បាយអូរ ខេម តីជីអ-2 ។

គុណប្រយោជន៍

ការប្រើប្រាស់

ប្រើថ្នាំ 1ml (1 សេសេ) លាយជាមួយទឹក 2-3លីត្រ ។ ដបនេះមានចំណុះ 500ml លាយជាមួយទឹក 1000-1500លីត្រ ។ បាញ់លើ
ស្លឹកផ្កាក្លីបផ្តុំចន្លោះពី 15-20 ថ្ងៃម្តង ។ ប្រើបានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ជំរុញពន្លកត្រួយ និងផ្កា

ថែអូរៀ 99%



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Thiourea:.....99%



មាឌទម្ងន់ 1 Kg



57

គុណប្រយោជន៍

ថែអូរៀ 99% ជាសារធាតុសំខាន់មួយក្នុងការរំលោភការបង្ការរុក្ខជាតិដែលបំបែកកើតថ្មីឡើងវិញឱ្យរលាយបាត់ ឆាប់ជ្រុះស្លឹក ចេញត្រួយថ្មីនិងចេញផ្កា ។
ការប្រើប្រាស់បរិមាណថែអូរៀខុសៗគ្នានៅតាមដំណាំនិងពេលវេលា។

ការប្រើប្រាស់

ប្រភេទដំណាំ	អត្រាប្រើប្រាស់	ប្រសិទ្ធភាព	ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់
ស្វាយ / ចន្ទី ទៀប	3-4គីឡូក្រាម/ទឹក1000លីត្រ	បាញ់បញ្ចេញត្រួយថ្មី	បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលរួចរាល់
	2-3គីឡូក្រាម/ទឹក1000លីត្រ	បាញ់បញ្ចេញផ្កា	នៅពេលស្លឹកតាចប្រើសម្រាប់ដាំដំណាំបន្ត (45-60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាត់អូរៀ)

ចំណាំ : (១)-គួរបាញ់នៅពេលព្រឹកឬល្ងាច ចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំង (២)-គួរចៀសវាងប្រើនៅលើដំណាំដែលមានពន្លកត្រួយស្លឹកនៅខ្លី
(៣)-គួរប្រើជីបំប៉ន នឹងទឹកថែទាំដើមឈើឱ្យបានល្អជាមុនសិន មុននឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំថែអូរៀ (៤)-អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយជីបំប៉នផ្សេងៗទៀតបាន

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីថ្នាំកសិកម្ម

Silicone adjuvant

QS-302



ទីតាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

100% polysiloxane compound



មាតិកាចំណុះ: 250ml



58

គុណប្រយោជន៍

ប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីថ្នាំកសិកម្ម

- 1/ ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីថ្នាំកសិកម្ម
- 2/ ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីថ្នាំ
- 3/ ជួយឲ្យដីថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរ

ការប្រើប្រាស់

ប្រើប្រាស់ជាមួយ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត និងដីបាញ់លើស្លឹកផ្សេងៗ ។ ប្រើប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីថ្នាំកសិកម្ម
5-8ml / ធុងបាញ់ 25L , ការ 500ml/800-1500លីត្រទឹក, ការ 1លីត្រ (1000ml) / 1500-3000លីត្រទឹក ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ទេចស្មៅ
បុប្ផាស្លឹកស្រួច



ក្នុងចម្ការដំឡូងមី ដំឡូងជ្វា
សណ្តែក លូ
ខ្ទឹម ប៉ុកគក់ បន្លែគ្រប់ប្រភេទ

15EC

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Quilzalofof-p-ethyl 15% EC



មាតិកា: 1L



59

គុណប្រយោជន៍

Quilzalofof-p-ethyl 15%EC គឺជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដូចជា : ស្មៅ ពោតសំឡី ស្មៅកម្ទេចស្មៅ ស្មៅស្រូវ(ស្មៅមមីស ស្មៅមាស់)និងស្មៅស្លឹកស្រួចគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងចម្ការដំឡូងមី ដំឡូងជ្វា សណ្តែកសៀង សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី លូ ខ្ទឹម ប៉ុកគក់ និងបន្លែគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ដោយមានឥទ្ធិពលបញ្ចាបចូលតាមប្រព័ន្ធស្លឹក បញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធបួសស្មៅ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន**4-5**ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី **6-7**ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់បួស។ ពេលបាញ់ដីក្នុងចម្ការគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (**អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់**) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាច គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំត្រូវចៀសវាងកុំអោយត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច**6**ម៉ោង ទើបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ មុននឹងបាញ់ត្រូវក្រសែកដល់ថ្នាំជាមុនសិន។

ការប្រើប្រាស់

ស្មៅនៅក្នុងស្លឹក**3-5**ប្រើថ្នាំ**60-80ml**ក្នុង**1**ធុងបាញ់ទឹក **25**លីត្រ។ ស្មៅចាស់ស្លឹក**6-7**ឡើងទៅប្រើថ្នាំ**100-120ml**ក្នុង**1**ធុងបាញ់ទឹក**25**លីត្រ។ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(**Alkaline**)ឬថ្នាំសឹកម្នីដទៃទៀត។ ហាមប្រើនៅពេលពោតចេញផ្កា។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ ស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ

ក្នុងចម្ការដំឡូងមី
សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី
សណ្តែកសៀង ប៊ុកគក់

225 OD

Quizalofop-p-ethyl 10% EC + Fomesafen 12,5% EC



មាត្រដ្ឋាន: 1L

Bopha បុប្ផា
Organic Agriculture ធៀបដាក់លើគុណភាព

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080



60

គុណប្រយោជន៍

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានពិសេសធាតុ Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកស្រួចនិងស្មៅស្លឹកធំដូចជា : ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅកម្រងស្លឹក ស្មៅពោតសំន្រី ស្មៅត្រែង ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ត្រកួនភ្នំត្រកួន ធ្នូ កាជីប ប្រមោយដំរី កន្ទ្រាំងខែត្រ ស្លាបទា វល្លិតាអឺក និងស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ ជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងចម្ការ ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង ប៊ុកគក់ ។ វាមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់និងជ្រាបចូលតាម រយៈស្លឹក និងដើមរហូតដល់បួសដោយទៅបំផ្លាញកោសិកាពូជសរសៃរបស់ស្មៅធ្វើអោយស្មៅងាប់និងអាចទប់ស្កាត់ស្មៅមិនឲ្យលូតលាស់បាន និងមិនប៉ះពាល់ដល់ ដំណាំដែលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ដូចខាងលើ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន 4-5 ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី 6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់បួសនិងស្លឹក បន្តិចម្តងៗរហូតដល់ស្មៅងាប់។ ពេលបាញ់ក្នុងចម្ការដំឡូងមីគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រួច 2-3 ថ្ងៃ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាច គួរចៀសវាងបាញ់នៅ ពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ត្រូវចៀសវាងកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ការប្រើប្រាស់

- ស្មៅនៅតូចស្លឹក 2-4 ម៉ែត្រ (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 60-70ml លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
- ស្មៅចាស់ស្លឹក 5-7 ម៉ែត្រ (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 80-100ml លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
- ថ្នាំ 1L លាយទឹកបានពី 250-300L សម្រាប់ផ្ទៃដីចន្លោះពី 1 - 1.2 ហិកតា ។

ចំណាំ : អាចប្រើលាយជាមួយដី (ហើមមិច ហ្វូរីច 95) ឬ 2 ស្លាបក្រាបាយឈាមទឹក 25លីត្រដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្លាប់ស្មៅនិងមិនឲ្យដំណាំអស់បូកទ្រុឌទ្រោម ។

☞ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង (Alkaline) ថ្នាំសត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺនិងជីប៉ូតដែលមិនបានណែនាំ ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាំជាមុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំឈ្នុតកម្ចាត់ស្មៅ

ក្នុងចម្ការដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង ប៊ុកគក់

បុប្ផាស្លឹកស្រួច 15 EC

+ បុប្ផាស្លឹកធំ 25 SL



ទីនាក់ទីនងផ្នែកបច្ចេកទេស

Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080

031 788 8080

Quizalofop-p-ethyl 15% EC + Fomesafen 25% SL



មាឌចំណុះ 2L



61

គុណប្រយោជន៍

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានពីរសារធាតុ Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកស្រួចនិងស្មៅស្លឹកធំដូចជា : ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅកម្រងស្លឹក ស្មៅរោតស័ន្ទី ស្មៅត្រែង ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយផ្លែ ត្រកួនឆ្ន័ត្រកួន ផ្ទី កាជីប ប្រមោយដី កន្ត្រាំងខែត្រ ស្លាបទា វល្លិតាអើក និងស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ ជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងចម្ការ ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង ប៊ុកគក់ ។ វាមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទាល់និងជ្រាបចូលតាមរយៈស្លឹក និងដើមរហូតដល់ចូលដោយទៅបំផ្លាញកោសិកាជួរតាមរយៈស្មៅធ្វើអោយស្មៅងាប់និងអាចទប់ស្កាត់ស្មៅមិនឲ្យលូតលាស់បាន និងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណាំដែលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ដូចខាងលើ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន៤-៥ ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី ៦-៧ ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ចូលស្លឹកបន្តិចម្តងៗរហូតដល់ស្មៅងាប់។ ពេលបាញ់ក្នុងចម្ការដីគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រួច២-៣ថ្ងៃ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាច គួរបៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ត្រូវចៀសវាងកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច ៦ ម៉ោងទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ការប្រើប្រាស់

- ស្មៅនៅតូចស្លឹក ២-៤ ប្រើថ្នាំ (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 60-70ml លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
- ស្មៅចាស់ស្លឹក ៥-៧ ប្រើថ្នាំ (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 80-100ml លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
- ថ្នាំ 1L លាយទឹកបានពី 250-300L សម្រាប់ផ្ទៃដីចន្លោះពី 1 - 1.2 ហិកតា ។

ចំណាំ : អាចប្រើលាយជាមួយដី (ហើមមិច ហ្វូរិច ៩៥) ប្រើ ២ ស្លាបប្រាបាយឈាមទឹក 25លីត្រដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្លាប់ស្មៅនិងមិនឲ្យដំណាំអន់ឬក៏ទ្រុឌទ្រោម ។

ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង (Alkaline) ថ្នាំសត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺនិងជីប៉ងដែលមិនបានណែនាំ ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាំជាមុនសិន ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

បុប្ផាស្មៅពោធិ៍

4OD

មេនចំណុះ 1L



62

គុណប្រយោជន៍

Nicosulfuron ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការពោតដំណូងមានសកម្មភាពកម្ចាត់តាមរយៈការជ្រាបចូលបានឆាប់រហ័សតាមស្លឹក តាមដើមរហូតដល់ប្លូសរបស់ស្មៅ ។ អាចកម្ចាត់ប្រភេទស្មៅស្លឹកស្រួច ជាច្រើនប្រភេទដូចជា : ស្មៅស្លឹកស្រួច (កន្ទុយអ្នក ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅកម្ពុយស៊ីត ពោតសំឡី ស្មៅស្លឹកស្រួច ...ល...) ។ ក្រោយពីបាញ់បាន4-5ថ្ងៃ ធ្វើអោយស្មៅប្រេងពណ៌នៅជារព្យាបាល ចាប់ពី6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ប្លូស ។ ពេលបាញ់ដីក្នុងចម្ការនូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬចុងក្នុងថ្ងៃសំរាប់បាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំត្រូវចុះសំរាងកំអាយត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6ម៉ោង ទើបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ការប្រើប្រាស់

ពូជពោតដែលអាចប្រើបាន	ពេលប្រើប្រាស់និងប្រភេទស្មៅ	កម្រិតប្រើប្រាស់
NK S6248 , NK S7259 , NK S7328	- ស្មៅស្លឹកស្រួច (កន្ទុយឆ្កែ ស្មៅវែកក្បាល ស្មៅចំរៀង ស្មៅកម្រុយនីស្ត ពោតស័ង្ស ស្មៅស្លឹកស្រួច ...ល...) ។	ស្មៅតូច 60-70 ម.ល ក្នុងទឹក 25 លីត្រ ស្មៅធំ 80-100 ម.ល ក្នុងទឹក 25 លីត្រ
TF 222 , 5A 282 , LG36 769 , LG38 608 , LG38 609 , LG38 778		
GT 200 , GT 600 , GT 709 , GT 722 , GT 822		
CP 201 , CP 503 , CP 639 , CP 888		
Pacific 139 , Pacific 339 , Pacific 559 , Pacific 779 , Pacific 789	- បារាំង្រសីសម្លាប់ស្មៅ មុនពេលស្មៅផ្កា ដែលដីត្រូវមានសំណើមត្រចៀក	250-300L / ហិកតា
ផែមុន្រ្ត P4472 , P4546 , P4554 , P4567 , P3582		

ចំណាំ

- 1/ ពេលទឹកប្លូងពេញពេលយកមកប្រើប្រាស់ ស្រូវនឹងរលាកច្បាស់ពីរសប្តាហ៍ដល់បីសប្តាហ៍ពេលទឹកនោះដើម្បីស្រូបសំណល់ពេលប្រើប្រាស់ប្រាំសប្តាហ៍ម្ខាង ដែលមានសារធាតុ (Nicosulfuron 4% OD) ទៅប្រើអាចមានបញ្ហាដល់អាការសរសៃឆ្មុក ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 2/ ប្រសិនបើស្រូវប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 3/ ប្រសិនបើស្រូវប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 4/ ស្រូវនឹងរលាកច្បាស់ពេលយកមកប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 5/ ប្រសិនបើស្រូវប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 6/ ប្រសិនបើស្រូវប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ
- 7/ ប្រសិនបើស្រូវប្រើប្រាស់ពេលទឹកនៅតាមប្រភេទទាបដែលជានៅរំលង ២ បញ្ហាដូចជាស្រូវទទួលខ្លីដែលដុះសប្បុរសពេញ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៩ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

37 OD



ថ្នាំកម្រិតស្មើ បុប្ផាស្មៅពោត 40 OD



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Mesotrione 5% + Atrazine 20% OD



មាត្រដ្ឋាន: 1L



64

គុណប្រយោជន៍

បុប្ផាស្មៅពោត 40% OD គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់ស្មៅក្នុងវាលចម្ការពោត ម្ចាស់ អំពៅ ដែលផ្សំឡើងដោយសមាសធាតុពីរ Mesotrione+Atrazine នៅក្នុង ដបថ្នាំតែមួយអាចបង្ការនិងកម្ចាត់ពោតសំឡី ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចមាន (ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅកន្ទុយផ្លែ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន ...ល...) ពពួកស្មៅជ័រ (ថ្មី ថ្មីអាចមីមាន ត្រកួន ត្រកួនឆ្នំ ត្រកួនគេក ទន្រ្ទាំងខ្មៅ ទន្រ្ទាំងបាយស កាដិប ជន្ទល់ភ្នំ ប្រមោយដំរី ស្មៅស្លាបទា...ល...) និងយំគ្រាប់ស្មៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ដោយ មានឥទ្ធិពល បញ្ឈប់បច្ចុប្បន្នស្លឹកបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាសន៍ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន4-5ថ្ងៃ ធ្វើអោយស្មៅប្រពលទៅជាស្មៅហើយចាប់ពី6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើម រលួយដល់ប្រស ។

ការប្រើប្រាស់

ស្មៅនៅក្នុងស្រែ3-5ប្រើថ្នាំ60-80mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក 25លីត្រ ។ ស្មៅចាស់ស្លឹក 6-7ឡើងទៅប្រើថ្នាំ100-120mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក25លីត្រ ។ ហាមប្រើប្រាស់ជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(Alkaline)ឬថ្នាំសឹកម្នីដទៃទៀត ។ ហាមប្រើនៅពេលពោតចេញផ្កា ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវត្រឡប់ដប ថ្នាំជាមុនសិន។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ទេចស្មៅ


អាត្រាស៊ីន

ក្នុងចម្ការពោត

ម្ចាស់ អំពៅ

900 WDG

Atrazine 90% WDG



មាឌទម្ងន់ 700g



65

គុណប្រយោជន៍

អាត្រាស៊ីន 900 WDG គឺជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដូចជា : ផ្ទៃ ត្រកួនភ្នំ ប្រមោយដំរី និងស្មៅស្លឹកជំងាច្រើនប្រភេទទៀត នៅក្នុងចម្ការពោត ម្ចាស់ អំពៅ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ដោយមានឥទ្ធិពលបញ្ចៀសចូលតាមប្រព័ន្ធស្លឹកបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសរស្មៅ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន **4-5**ថ្ងៃ ធ្វើអោយស្មៅប្រពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី **6-7** ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់បួស ។ ពេលបាញ់ដីក្នុងចម្ការគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាចគួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំត្រូវចៀសវាង កុំអោយត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច **6** ម៉ោងទើបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ការប្រើប្រាស់

មុននឹងបាញ់ត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។ ស្មៅនៅតូចស្លឹក**3-5**ប្រើថ្នាំ**60-80ml**ក្នុង**1**ធុងបាញ់ទឹក **25**លីត្រ, ស្មៅចាស់ស្លឹក**6-7**ឡើងទៅប្រើថ្នាំ **100-120ml**ក្នុង**1**ធុងបាញ់ទឹក**25**លីត្រ ។ ហាមប្រើវាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(Alkaline)ឬថ្នាំសឹកម្លឹងទៀត ។ ហាមប្រើនៅពេល ពោតចេញផ្កា ។

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh

ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃ

បុប្ផាគុយស៊ីណេត

200



ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស
Tel. 011 76 8080 / 086 76 8080
031 788 8080

Glufosinate-Ammonium 200g/L SL



មាត្រដ្ឋាន: 1L, 4L



66

គុណប្រយោជន៍

បុប្ផាគុយស៊ីណេត គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅមិនជម្រើស ហើយវាជាប្រភេទថ្នាំជ្រាបផងនិងប៉ះផ្ទាល់ផង ។ វាអាចធ្វើឲ្យដើម និងស្លឹករបស់ស្មៅចង្រៃងាប់ កំឡុងពេលរលូតរលាស់ទឹកថ្នាំចូលរំលងឆ្ងាយៗ ពេលប៉ះជាមួយដី វាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីទេ និងមិនសង្កេតឃើញប្រសិនបើវា ។ អាចកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំត្រប់ប្រភេទលើដីណាដែលបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព វាអាចរំលាយស្មៅសំយោគរបស់ស្មៅក្នុងរយៈពេល 2-6 ម៉ោងបញ្ឈប់ការរលូតរលាស់ក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ ប្រភេទស្មៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ ហើយងាប់ក្នុងរយៈពេល 1-2 សប្តាហ៍ ។ វាអាចបំបាត់ស្មៅមិនឲ្យដុះឡើងវិញពេញមួយដុះនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ដីណា ក្នុងចម្ការឡើយ ។

ការប្រើប្រាស់

ដីណា	មុខងារកម្ចាត់	របៀបប្រើប្រាស់
កម្ចាត់ស្មៅតាមដីណា ដីឡូងមី ចន្ទី ស្វាយ កៅស៊ូ ទុរេន ចេក ស្រកាសាត ម្សៅ	ស្មៅស្លឹកស្រួច និងស្មៅស្លឹកធំដូចជា ស្មៅជើងក្រាស់ ស្មៅកម្រុយស្ល ក្រូចចិត្ត ស្មៅសំបុកមាត់ ត្រែង ស្បូវ រំលី ត្រកួន ផ្លី កាជីប ដើមទឹកដោះខ្លា...និងស្មៅវាបន្តទៅ	- សម្រាប់ស្មៅខ្ចីប្រើថ្នាំ 150-200ml ឈាមទឹក 25លីត្រ - សម្រាប់ស្មៅចាស់ប្រើថ្នាំ 200-250ml ឈាមទឹក 25លីត្រ
វិធីបាញ់ : បាញ់តាមចន្លោះដើម មិនត្រូវបាញ់ប៉ះលើដើមដីណាមានប្រយោជន៍ ។ ត្រូវបាញ់ឲ្យជោកលើដើម និងស្លឹកស្មៅចង្រៃ ដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពកាត់តែង ។		

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០K ផ្លូវលេខ ២៦៥ សង្កាត់ ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌ ទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 012 888 987 www.bopha.com.kh, Email: info@bopha.com.kh